

När ett nytt operationsformulär öppnas visas enbart den allra översta delen.

Där är det 3 variabler som styr vad som sedan ska visas. (Bilden i exemplet visar en inkontinensoperation).

Datum:   Huvudoperatör:    ST-läkare Medoperatör:

---

Operationsindikation:   Konsulterad  Operationen avbryts

---

Anestesi:  Intubationsnarkos  EDA  Spinal  L. A.  L. A. med sedering  Masknarkos  Larynxmask  PCB  Inst. av lokalbed. i blåsan  Annan:

---

Val inkontinens-/prolapsop:

---

Peroperativt bedöms tillståndet som

---

Operationen inleds som:

De tre variablerna som styr resten av operationsformuläret är:

**Operationens omfattning**” I denna rullgardin finns ett antal ”snabbval” för operationer som ofta utförs i det delregister patienten är inkluderad i, t ex valet ”Okomplicerad slyngplastik i inkontinensdelen.

**Peroperativt bedöms tillståndet som**” styr om variablerna för operation på benign indikation ska visas eller om formuläret för malignitetsmisstänkt/malign med alla tumörvariabler ska visas.

**Operationen inleds som**” styr i sin tur om t ex variablerna för laparoskopi/vaginal eller de för operation utförd abdominellt ska visas.

När alla dessa tre är ifyllda visas resterande variabler i formuläret. De olika valen som finns i ”operationens omfattning” och vad som markeras av programmet vid val av detta:

**WARNING! Om du gjort ett val i ”Operationens omfattning” och ändrar det till ett annat alternativ tas ALLT bort från de variabler som fyllts i längre ner i formuläret.**

## Operationsinledning

Datum:

**Datum** (obligatorisk) skrivs in manuellt eller väljs via kalenderikonen. Datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD. Klicka på knappen ”Idag” för att sätta dagens datum. Om du efterregisterar en operation, där operationsdatum är för mer än 30 dagar sedan får du en popup som frågar om det är säkert att operationsdatum är för mer än 30 dagar sedan. Klicka då OK om datumet är rätt eller avbryt om du vill ändra datumet.

Huvudoperatör:    ST-läkare

**Huvudoperatör** (obligatorisk), om den inloggade är läkare är dennes namn förvald i rullgardinen.

**Ny:** "grå knapp". Används enbart för att registrera en läkare som inte redan finns i rullgardinen

### Ny läkare

Förnamn:	<input type="text"/>
Efternamn:	<input type="text"/>
Titel:	<input type="text" value="Leg läkare"/>
Personnummer:	<input type="text"/>

ST-läkare (inte obligatorisk), kryssruta för att markera att huvudoperatören är ST-läkare.

Medoperatör:

**Medoperatör:** (ej obligatorisk) (visas vid optyp hyst, adnex, tumör, inkont och prolaps)

Välj ett alternativ i rullgardinen. Knappen Ny fungerar på samma sätt som för huvudoperatör.

Medoperatör:

**Medoperatör (2):** (ej obligatorisk) (visas vid optyp tumör)

Samma funktion som medoperatör 1.

## Operationsindikation

Operationsindikation:

**Samma utseende oavsett operationstyp.**

**Operationsindikation:** (ej obligatorisk) texten hämtas från den indikation man satt som huvudindikation via anamnesträdet.

CA 125  Nej  Ja    Värde:     Datum:

CA 125 (Endast vid tumörkirurgi): Speglas från anamnesformuläret, för att ge påminnelse om komplettering om det ej är registrerat i tidigare.

**Konsultopererad**

Konsultopererad

**Konsultopererad** ×

Markeras om man vill registrera en benign operation utförd av **gynekolog** som konsultoperatör på en patient som sköts via annan klinik och där patienten postoperativt inte sköts av gynekolog. Vid markering av konsultoperation förväntas ingen ytterligare registrering. Om patienten förs över till gyn-avdelning postoperativt skall konsultoperation ej markeras.

**Operationen avbryts**

Operationen avbryts i

**Operationen avbryts** ×

Har operationen avbrutits kan ofta inte operationsfliken fyllas i komplett. Fyll i, registrera det du kan. Du kommer när du lämnar operationsfliken få en uppmaning om att om möjligt komplettera. Därefter är operationsfliken klar och kommer att behandlas som färdigfylld. Pat kommer inte att följas med enkäter”.

**Anestesi**

**Anestesi:**  Intubationsnarkos  EDA  Spinal  L. A.  L. A. med sedering  Masknarkos  Larynxmask  PCB  Inst. av lokalbed. i blåsan  
 Annan: Vad:

**Anestesi** (obligatorisk) kryssrutor:

- Intubationsnarkos
- EDA
- Spinal
- L.A
- L.A med sedering
- Masknarkos
- Larynxmask
- PCB
- Inst. av lokalbed. i blåsan (finns enbart för inkontinens)
- Annan:

## Operationens omfattning

Med val av operationens omfattning görs ett antal förval för att underlätta registreringen. Valen ser lite olika ut beroende på vilken operation patienten ska genomgå.

Val inkontinens-/prolapsop:  ▼

Välj omfattning av operation inre genitalia: i  ▼

Val operation intrauterint:  × ▼

Val vulvaoperation: Endast vulvaoperation x ▼

Vilka är förvalen och vad sätts?

### **För inkontinens/prolaps**

Okomplicerad inkontinens-slyn x ▼

- Endast prolapsop
- Okomplicerad inkontinens-slyngplastik
- Intravesikal Botoxbehandling
- Annan inkontinens op
- Kombination inkontinens och prolapsop
- Annan (inga automatiska förifyllda fält)

#### **Endast prolapsop**

Peroperativt bedöms tillståndet = Benigt, Prolapskirurgi markeras

#### **Okomplicerad inkontinens-slyngplastik**

Peroperativt bedöms tillståndet = Benigt,

Inkontinenskirurgi markeras

Konvertering samt Peroperativ komplikation = Nej,

Typ av inkontinensoperation = Slyngplastik, mitturetra, Implantat = Ja

Preparat tas = Nej

Blödning peroperativt = 25 ml

#### **Intravesikal botoxbehandling**

Peroperativt bedöms tillståndet = Benigt

Operationen inleds som = Cystoskopisk op

Inkontinenskirurgi markeras

Drän anlagts = Nej

Bukvätska till cyt = Nej

Prep till PAD = Nej

Blödning = 0 ml

#### **Annan inkontinensop**

Peroperativt bedöms tillståndet = Benigt

Inkontinenskirurgi markeras

#### **Kombination inkontinens prolapsop**

Peroperativt bedöms tillståndet = Benigt

Inkontinens- och prolapskirurgi markeras

### **Annan**

Inget förvalt

### **För hyst/adnex/tumör**

Adnex- och uterusoperation, ej x ▼

Uterusoperation/hysterektomi

Adnexoperation

Adnex- och uterusoperation, ej mer

Mer än adnexa och uterus

Endast diagnostisk laparoskopi

Annan (inga automatiska förifyllda  
fält)

### **Uterusoperation/hysterektomi**

Uterus-/cervixkirurgi markeras

### **Adnexoperation**

Adnexkirurgi markeras

### **Adnex- och uterusoperation, ej mer**

Uterus-/cervixkirurgi samt Adnexkirurgi markeras

### **Mer än adnexa och uterus**

Uterus-/cervixkirurgi samt Adnexkirurgi markeras

### **Endast diagnostisk laparoskopi**

Diagn. Laparoskopi markeras

Drän anlagts = Nej

Blödning perop = 25 ml

### **Annan**

Inget förvalt

Om **malignitetsmisstänkt/malign** är vald för någon av ovanstående är även Intraabdominell tumörkirurgi markerad

### **För hysteroskopi**

Diagnostisk hysteroskopi ▼

- Endast intrauterin kirurgi
- Diagnostisk hysteroskopi
- Hysteroskopisterilisering
- Mer än hysteroskopisk kirurgi
- Annan (inga automatiska förifyllda fält)

### **Endast intrauterin kirurgi**

Operationen inleds som = Hysteroskopi/intrauterin op

Hysteroskopisk kirurgi markeras

Drän anlagts = Nej, Bukvätska till cyt = Nej

Hudsutur = Ej aktuellt att suturera

### **Diagnostisk hysteroskopi**

Operationen inleds som = Hysteroskopi/intrauterin op

Hysteroskopisk kirurgi markeras

Diatermi = Nej

Utförd(a) operation(er): Diagnostisk hysteroskopi är markerad

Drän anlagts = Nej, Bukvätska till cyt = Nej

Hudsutur = Ej aktuellt att suturera

### **Hysteroskopisterilisering**

Operationen inleds som = Hysteroskopi/intrauterin op

Hysteroskopisk kirurgi markeras

Utförd(a) operation(er): Hysteroskopisterilisering är markerad, fritextfält = annan

Drän anlagts = Nej, Bukvätska till cyt = Nej

Hudsutur = Ej aktuellt att suturera

### **Mer än hysteroskopisk kirurgi**

Operationen inleds som = Hysteroskopi/intrauterin op

Hysteroskopisk kirurgi markeras

### **Annan**

Inget förvalt

### **För vulvatumör**

Endast vulvaoperation

- Endast vulvaoperation
- Annan (inga automatiska förifyllda fält)

### **Endast vulvaoperation**

Operationen inleds som = Vulva (tumör-op)

Abdominell tumörkirurgi = Nej

Vulvacancerkirurgi= Ja

Bukvätska till cyt = Nej

### **Annan**

Operationen inleds som = Vulva (tumör-op)

Abdominell tumörkirurgi = Nej

Vulvacancerkirurgi= Ja

## Peroperativt bedöms tillståndet som

Peroperativt bedöms tillståndet som Benigt

### **Samma utseende oavsett val av operationstyp (ej bristning)**

Detta val styr om formuläret för tumörkirurgi ska visas eller ej.

**Peroperativt bedöms tillståndet som** (obligatorisk)

Välj i rullgardin mellan:

- Benigt
- Malignitetsmisstänkt (formulär tumörkirurgi visas)
- Malignt (formulär tumörkirurgi visas)

## Operationen inleds som

För att få rätt åtgärdskod (beroende av valet abdominell, vaginal etc) ska sättet att inleda operationen anges i rullgardinen.

Operationen inleds som:

A dropdown menu with an orange header bar. The menu is open, showing a list of surgical approaches:

- Abdominell op
- Laparoskopisk op
- Robotassisterad laparoskopisk op
- Vaginal op
- Vulva (tumör-op)
- Hysteroskopi/intrauterin op
- Cystoskopisk op

Alla alternativ visas för alla operationer.

### Abdominell op, följdfrågor

A dropdown menu labeled 'Buksnitt' with an orange header bar. The menu is open, showing a list of incision types:

- Medellinje
- Pfannenstiel
- Cohen
- U Annat

Buksnitt (obligatorisk) rullgardin:

- Medellinje
- Pfannenstiel
- Cohen
- Annat
  - Vad: Textruta för att förtydliga Annat (ej obligatorisk)

### Laparoskopisk op och laparoskopisk robotassisterad, följdfrågor

Operationen inleds som:

A dropdown menu with 'Laparoskopisk op' selected and a downward arrow on the right.

Införande av första trokar:

A dropdown menu with 'Gasinsuff före tro' selected and a downward arrow on the right.

Införande av första trokar (rullgardin):

- Gasinsuff före trokar
- Trokar blint utan gas
- Öppet
- Annat:
  - Vad: Textruta som förklarar (ej obligatorisk)



Konvertering:

Buksnitt

pga:  Komplikation

Tekniskt svårt

Annat

### **Konvertering kryssruta (samma för alla op. typer)**

Om kryssrutan "Konvertering" markeras öppnas rutor för att fylla i orsaken till konverteringen (obligatoriska):

- Komplikation
- Tekniskt svårt
- Annat

### **Buksnitt, (obligatorisk) rullgardin:**

- Medellinje
- Pfannenstiel
- Cohen
- Annat
  - Vad: Textruta för att förtydliga Annat (ej obligatorisk)

### **Cystoskopisk op**

**Operationen inleds som:**

Cystoskopisk op

Används vid botoxinjektioner för inkontinensbehandling..